



El Sistema Modelo de Lesión de la Médula Espinal fue creado en 1970 como un estudio longitudinal prospectivo multicéntrico sobre la demografía y el uso de los servicios por parte de las personas con lesión traumática de la médula espinal (LME) en Estados Unidos.

Esta hoja de datos da una referencia rápida sobre el estado demográfico y de afección de 36,993 personas con LME rastreadas hasta 2023 por 32 Sistemas Modelo de LME financiados por el gobierno federal y 4 centros de Formulario II (seguimiento) e ingresadas en la Base de Datos Nacional de LME. Esta hoja de datos no incluye a las 15,789 personas que no fueron elegibles completamente para incluir en el seguimiento, pero que se agregaron al registro de la base de datos de LME.

Centro Nacional de Estadística de LM515 España Centro de Rehabilitación
1717 6ª Avenida Sur
Birmingham, AL 35233-7330

Para obtener estadísticas, llamar al: 205-934-3342
TDD: 205-934-4642
Fax: 205-934-2709
Correo electrónico: NSCISC@uab.edu
Sitio web: uab.edu/NSCISC



Incidencia

En Estados Unidos, en 2023 se ha estimado el tamaño de la población en unos 335 millones de personas. La estimación más reciente de la incidencia anual de las lesiones traumáticas de la médula espinal (LME) es de aproximadamente 54 casos por millón de personas en Estados Unidos, lo que equivale a unos 18,000 nuevos casos de LME traumáticas cada año. Los nuevos casos de lesiones de la médula espinal no incluyen a las personas que mueren en el lugar del incidente que causó la lesión de la médula espinal.

- **Fuente de datos:** Jain NB, Ayers GD, Peterson EN, et al. *Traumatic spinal cord injury in the United States* (lesión traumática de la médula espinal en Estados Unidos), 1993-2012. JAMA. 2015; 313(22):2236-2243.

Prevalencia

El número estimado de personas con LME que viven en Estados Unidos es de aproximadamente 305,000 personas, con un rango de 257,000 a 388,000 personas.

- **Fuente de datos:** Lasfargues JE, Custis D, Morrone F, Carswell J, Nguyen T. *A model for estimating spinal cord injury prevalence in the United States* (un modelo para estimar la prevalencia de lesiones de la médula espinal en Estados Unidos). Parapleja. 1995; 33(2):62-68.

Edad en el momento de la lesión


La edad promedio de la persona en el momento de sufrir la lesión ha aumentado, pasando de 29 años de edad en la década de 1970 a 43 años a partir de 2015.

Sexo

Desde 2015 alrededor del 79% de los nuevos casos de lesiones traumáticas de la médula espinal son hombres.


Raza/Etnia

Recientemente, cerca del 25% de las lesiones han ocurrido entre el grupo de negros no hispanos, equivalente a una proporción más elevada que la que ocupan los negros no hispanos con respecto a la población en general (13%).



Causa

Los choques de vehículos son la principal causa de lesiones más reciente, seguidos de cerca por las caídas. Los actos de violencia (principalmente heridas por proyectil de arma de fuego) y las actividades deportivas y recreativas también son causas relativamente comunes.




Duración de la estadía

La duración media de la estadía en la unidad de cuidados intensivos del hospital ha disminuido de 30 días en la década de 1970 a 19 días desde 2015. La duración promedio de la estadía de rehabilitación también ha disminuido, pasando de los 110 días en la década de 1970 a 37 días desde 2015.

- **Nota:** A partir de 2024, esta hoja de datos difiere de años anteriores. En ella se muestra la duración de la estancia en promedios. En los años anteriores los datos se mostraban en términos de la mediana.

Nivel neurológico y extensión de la lesión

Recientemente, la tetraplejía incompleta es la categoría neurológica más frecuente. La frecuencia de la paraplejía incompleta y completa es prácticamente la misma. Menos del 1% de las personas experimentó una recuperación neurológica completa en el momento del alta hospitalaria.



Escolaridad

Desde 2015, alrededor de una cuarta parte de las personas con lesión de la médula espinal tienen un título universitario en el momento de su lesión, en comparación con el 45% de las personas que sobrevivieron 40 años de lesión.

Escolaridad (%)	En el momento de la lesión	Año 1	Año 10	Año 20	Año 30	Año 40
Solo escuela secundaria	52.1	52.6	49.5	46.7	41.7	35.5
Universidad o superior	23.5	25.8	28.6	27.8	34.3	44.7

Situación laboral

Desde 2015, el 18% de las personas con LME están empleadas en el año 1 después de la lesión. La tasa de empleo aumenta con el tiempo antes de alcanzar su punto máximo 30 años después de la lesión.

Estado (%)	En el momento de la lesión	Año 1	Año 10	Año 20	Año 30	Año 40
Empleado	65.0	17.8	24.7	28.7	30.8	27.0
Estudiante	6.8	5.8	2.6	0.7	0.3	0.1

Costos históricos de por vida

Los gastos anuales promedio (costos de atención médica y gastos de manutención) y los costos estimados de por vida que son directamente atribuibles a la lesión de la médula espinal, varían en gran medida según la escolaridad, el deterioro neurológico y el historial laboral de la persona previo a la lesión. Las siguientes estimaciones no incluyen ningún costo indirecto, como pérdidas de salarios, beneficios complementarios y productividad (los costos indirectos promediaron \$92,578 por año en dólares de 2023).

Gravedad de la lesión	Gastos anuales promedio (en dólares de 2023)		Costos estimados de por vida por edad en el momento de la lesión (con un descuento del 2%)	
	Primer año	Cada año subsiguiente	25 años	50 años
Tetraplejía alta (C1-C4) AIS ABC	\$1,369,755	\$237,862	\$6,077,646	\$3,340,171
Tetraplejía baja (C5-C8) AIS ABC	\$989,768	\$145,918	\$4,440,708	\$2,731,432
Paraplejía AIS ABC	\$667,569	\$88,433	\$2,971,942	\$1,950,396
Funcional motora a cualquier nivel AIS D	\$447,037	\$54,298	\$2,030,446	\$1,433,145

Fuente de datos: Impacto económico de la lesión de la médula espinal publicado en la revista *Topics in Spinal Cord Injury Rehabilitation*, Volumen 16, Número 4, en 2011. La Escala de Deterioro de la Asociación Americana de Lesiones de la Columna Vertebral (AIS, por sus siglas en inglés) ha sido utilizada para calificar la gravedad del deterioro neurológico de una persona después de una lesión de la médula de la médula espinal.

Esperanza de vida histórica

El promedio de años de vida restantes para las personas con LME no ha mejorado desde la década de 1980 y sigue siendo significativamente inferior a la esperanza de vida de las personas sin LME. Las tasas de mortalidad son significativamente más altas durante el primer año después de la lesión que durante los años siguientes, particularmente para las personas con deficiencias neurológicas más graves. En el sitio uab.edu/NSCISC se presenta una herramienta personalizable para calcular la esperanza de vida.

Edad en el momento de la lesión	No LME	Esperanza de vida (años) después de la lesión según la gravedad de la lesión y la edad en el momento de la lesión									
		Para las personas que sobreviven las primeras 24 horas						Para personas que sobreviven al menos 1 año después de la lesión			
		Tetraplejía alta (C1-C4) AIS ABC	Tetraplejía baja (C5-C8) AIS ABC	Paraplejía AIS ABC	Funcionalidad motora AIS D (Cualquier nivel)	Dependiente de ventilador (Cualquier nivel)	Tetraplejía alta (C1-C4) AIS ABC	Tetraplejía baja (C5-C8) AIS ABC	Paraplejía AIS ABC	Funcionalidad motora AIS D (Cualquier nivel)	Dependiente de ventilador (Cualquier nivel)
20	57.7	29.6	36.2	41.7	49.3	9.0	30.2	36.7	41.8	49.4	15.6
40	39.3	18.6	22.5	27.3	32.7	7.7	19.1	22.8	27.3	32.7	11.8
60	22.2	10.2	11.7	14.7	17.9	3.5	10.9	12.0	14.7	17.8	7.1

Causas históricas de muerte

Se ha dado seguimiento a las personas inscritas en la Base de Datos Nacional de LME hasta 50 años después de la lesión. Durante ese tiempo, las causas de muerte que parecen tener el mayor impacto en la reducción de la esperanza de vida de esta población son la neumonía y la septicemia. Las tasas de mortalidad por cáncer, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, enfermedades arteriales, embolia pulmonar, enfermedades urinarias, enfermedades digestivas y suicidio han ido disminuyendo. Sin embargo, estos avances se ven contrarrestados por el aumento de las tasas de mortalidad por enfermedades endocrinas, metabólicas y nutricionales, accidentes, enfermedades del sistema nervioso, trastornos musculoesqueléticos y trastornos mentales. No ha habido cambios en la tasa de mortalidad por septicemia en los últimos 50 años, y solo ha habido una ligera disminución en la mortalidad por enfermedades respiratorias.

- Fuente de datos:** DeVivo, M. J., Chen, Y., & Wen, H. (2022). *Cause of death trends among persons with spinal cord injury in the United States: 1960-2017* (Tendencias de las causas de muerte entre las personas con lesión de la médula espinal en Estados Unidos: 1960-2017). *Archives of physical medicine and rehabilitation*, 103(4), 634-641.

© 2024 Board of Trustees, Universidad de Alabama. Esta es una publicación del National Spinal Cord Injury Statistical Center en colaboración con el Model Systems Knowledge Translation Center. El contenido de la publicación fue desarrollado en el marco de subvenciones del Instituto Nacional de Investigación sobre la Discapacidad, la Vida Independiente y la Rehabilitación (NIDILRR números de subvención 90SIMS0016 y 90DPKT0009). NIDILRR es un Centro dentro de la Administración para la Vida Comunitaria (ACL, por sus siglas en inglés), Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés). El contenido no representa necesariamente la política de NIDILRR, ACL, HHS, por lo que no se debe asumir el endorso por parte del Gobierno Federal.

Cita del documento: National Spinal Cord Injury Statistical Center, *Traumatic Spinal Cord Injury Facts and Figures at a Glance*. Birmingham, AL: University of Alabama at Birmingham, 2024.

Estado civil

Desde 2015, el porcentaje de personas que siguen casadas se mantiene relativamente constante hasta el año 30 después de la lesión, en tanto que el grupo de solteros/nunca casados disminuye lentamente y los divorciados ha ido creciendo lentamente.

Estado civil (%)	En el momento de la lesión	Año 1	Año 10	Año 20	Año 30	Año 40
Soltero	44.9	43.5	38.3	36.4	34.1	24.1
Casado	36.7	36.5	34.1	34.4	35.4	44.5
Divorciado	8.6	10.3	18.4	19.9	22.5	22.0

Rehospitalización

Desde 2015, cerca del 30% de las personas con lesión de la médula espinal son hospitalizadas de nuevo al menos una vez durante cualquiera de los años, posteriores a la s lesión. Entre los rehospitalizados, la estadía promedio es de unos 18 días. Las enfermedades del sistema genitourinario son la principal causa de rehospitalización, seguidas de las enfermedades de la piel. Las enfermedades respiratorias, digestivas y musculoesqueléticas también son causas comunes.